

ГИНЕСТРИЛ®

мифепристон 50 мг №30

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩАЯ ТЕРАПИЯ МИОМЫ МАТКИ

размером до 12 недель беременности

Уменьшает размеры миоматозных
узлов на 47–58% и предотвращает
появление новых^{1,2}

1. Самойлова Т.Е., Гус А.и., Аль-Сейкал Т.С. Применение Мифепристона в лечении леймиомы матки. Тезисы второго Российского Конгресса по менопаузе и гинекологической эндокринологии 14–17 сентября 2004 г.

2. Карева Е.Н., Мифепристон и миома матки. Фарматека № 14-2010.

Гинестрил. Показания к применению: Лечение лейомиомы матки (размером до 12 недель беременности). **Способ применения и дозы:** Внутрь, 1 таблетка (50 мг) один раз в сутки. Курс лечения – 3 месяца. **Противопоказания:** Беременность, период грудного вскармливания; повышенная чувствительность к мифепристону или другим компонентам препарата; лейомиома матки, превышающая в размерах 12 недель беременности; опухоли яичников, гиперплазия эндометрия, субмукозное расположение миоматозных узлов; воспалительные заболевания женских половых органов, длительная глюкокортикостероидная терапия, острая или хроническая почечная и/или печеночная недостаточность и др. **С осторожностью:** Хронические обструктивные заболевания легких, бронхиальная астма, тяжелая артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца, хроническая сердечная недостаточность. **Побочное действие:** Дискомфорт и боль внизу живота, головная боль, тошнота, рвота, диарея, аменорея, олигоменорея, гипертермия, слабость, простая гиперплазия эндометрия (обратимая после отмены препарата) и др..

Распространяется исключительно в местах проведения медицинских фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий.

Информация для медицинских и фармацевтических работников

Код материала: 100945

Дата выхода материала: январь 2022

АО "Нижфарм", 603950, г. Нижний Новгород,
ул. Салганская, д. 7, Бокс № 459

Тел.: +7 831 278 8088 Факс: +7 831 430 7213

E-mail: med@stada.ru



РУ № Р N002340/02 от 14.03.2008

